

Agrotechnické charakteristiky

Odrůda	Ošetření fungicidy	Potřeba morforegulátoru při vyšší intenzitě pěstování v dávce	Pozdní setí	Citlivost na obilní předplodinu
Absolut	2×	nižší až střední	NE	NE
Alcantara	2×	nižší	NE	NE
Ampleur	2×	nižší	NE	NE (kromě kukuřice)
Artimus	2×	nižší	NE	ANO
Avenue	2×	nižší	NE	NE
Bodyček	2×	střední až vyšší	NE	NE
Bonanza	1×	nižší	ANO	NE
Brilliant	2×	nižší	ANO	NE
Butterfly	1×-2×	střední	ANO	ANO
Dagmar	2×	střední	ANO	NE
Fenomen	2×	nižší	ANO	NE (kromě kukuřice)
Genius	2×-3×	střední	ANO	NE (kromě ječmene)
Illusion	2×	nižší	ANO	NE
Johnson	1×	nižší	ANO	NE
Julie	2×	střední až vyšší	ANO	NE
Kalbex	2×	střední až vyšší	ANO	NE
LG Absalon	2×	střední	ANO	NE
LG Aikido	2×	nižší	NE	NE (kromě kukuřice)
LG Atelier	2×	střední	ANO	NE
LG Lunarís	1×-2×	nižší	ANO	NE
LG Mocca	2×	střední až vyšší	ANO	NE
LG Mondial	1×-2×	nižší	ANO	NE
LG Niklas	2×	střední	NE	NE
LG Rozarka	2×	střední	NE	NE
Luxus	2×	střední až vyšší	ANO	NE
Moschus	1×-2×	nižší	ANO	NE
Netta	1×-2×	střední	ANO	NE
Pallas	2×	střední	ANO	NE
Piruetá	1×	nižší	NE	NE
Ponticus	1×-2×	nižší	ANO	NE
Pontiform	2×	nižší	ANO	NE
Revolver	1×-2×	střední	ANO	NE
RGT Borsalino	1×-2×	nižší	ANO	NE
RGT Depot	2×	nižší	ANO	NE
RGT Reform	2×	střední	ANO	NE
Skif	1×-2×	nižší	ANO	NE (kromě kukuřice)
SU Tarroca	2×	střední	ANO	NE (kromě kukuřice)
Turandot	1×-2×	střední až vyšší	ANO	NE
Viriato	2×-3×	nižší	NE	NE (kromě kukuřice)

Tyto agrotechnické charakteristiky jsou převzaty z materiálů a doporučení jednotlivých firem a jsou pouze orientační.
Je třeba zohlednit stav porostu z pohledu vlivu ročníku a odrůdy, intenzity pěstování a infekčního tlaku chorob, neboť počet fungicidních vstupů může být vyšší.